

• عناصر کم مصرف به صورت کلات EDTA + نیتروژن + منیزیم + اسید آمینه

تراست میکرو ترکیب متعادلی از کلیه عناصر ریزمغذی به صورت کلات EDTA به همراه نیتروژن و منیزیم می باشد. این محصول همچنین دارای اسیدهای آمینه آزاد است که علاوه بر مقاومت گیاه به انواع تنش‌های محیطی در جذب و انتقال بهتر عناصر غذایی کمک خواهد کرد. متابولیسم گیاه را افزایش داده و سرعت نقل و انتقال مواد را افزایش می دهد. عناصر کم مصرف در مقایسه با عناصر پر مصرف به مقدار کمتری مورد نیاز گیاهان می باشند، اما نقش و جایگاه ویژه ای در تولید محصول دارند. در نتیجه کمبود آنها تعادل رشد و نمو شاخه، برگ و میوه ها به هم خورده و تولید محصول کاهش می یابد. این عناصر در تولید و سنتز هورمونهای گیاهی، آنزیم ها، کلروفیل برگ، میوه و شاخه ها موثر هستند.



ترکیبات		ترکیبات	
۰/۱۵٪	مس (Cu-EDTA)	۳٪	نیتروژن آلی (N)
۰/۰۵٪	مولیبدن (Mo)	۱٪	منیزیم (MgO)
۰/۱۵٪	بُر (B)	۴٪	آهن (Fe-EDTA)
۰/۱۵٪	سولفور (S)	۲٪	روی (Zn-EDTA)
۵٪	اسید آمینه آزاد (A.A)	۱/۵٪	منگنز (Mn-EDTA)

تراست میکرو را می توان به صورت محلولپاشی بر روی برگها و همچنین استفاده مستقیم در آب آبیاری در طول فصل رشد و نمو گیاه استفاده کرد. بهتر است برای حصول نتیجه بهتر قبل از مشاهده علائم کمبود استفاده شود. در صورت بروز علائم کمبود دفعات مصرف را تکرار نموده و یا به صورت همزمان از روش کود دهی با آبیاری و محلولپاشی روی برگها استفاده نمائید. در موارد استفاده به صورت محلولپاشی روی برگها (برگپاشی) از حداکثر مقادیر پیشنهادی تجاوز نکنید. از استفاده در زیر تابش شدید نور آفتاب خودداری کنید و در هوای گرم با حداقل دز استفاده کنید.

• برگپاشی

مرکبات / انگور: به میزان ۱-۵/۰ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در مراحل قبل از گلدهی، پس از تشکیل میوه و در طی درشت شدن میوه ها استفاده شود.

درختان پسته / درختان میوه دانه دار: به میزان ۱-۵/۰ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب پس از گلدهی استفاده شود.

هسته دار (هلو، آلو، زردآلو، گیلاس، شلیل): ۵/۰-۷/۰ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب پس از ریزش گلبرگها و در طی درشت شدن میوه ها استفاده شود. در هلو و شلیل از حداکثر دز توصیه شده تجاوز نمائید.

صیفی جات / محصولات زراعی: ۱-۵/۰ کیلوگرم در هکتار از زمان ۶-۴ برگی شدن بوته ها استفاده شود. هر ۳-۴ هفته یک بار تکرار شود.

گیاهان زینتی: ۱-۵/۰ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب از زمان ۶-۴ برگی استفاده شود. در صورت نیاز ۳-۴ هفته یک بار تکرار شود.

• خاکی

درختان میوه / مرکبات / پسته: ۴-۲ کیلوگرم در هکتار از اوائل رشد درخت تا پایان فصل رشد

گیاهان زراعی / صیفی جات: ۲-۱ کیلوگرم در هکتار در هر نوبت استفاده شود. از شروع رشد محصول تا ۳۰ روز قبل از برداشت نهائی.

گیاهان زینتی: ۳-۲ کیلوگرم در هکتار در هر مرحله و از اوائل رشد رویشی گیاه استفاده شود.

• آبکشت (هیدروپونیک)

۵۰ گرم در ۱۰۰۰ لیتر آب مطابق با برنامه غذایی گیاه استفاده شود.

• قابلیت اختلاط

تراست میکرو با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است. از اختلاط آن با سموم حشره کش و ترکیبات با پایه عنصر مس اجتناب کنید.



Quimical Tierra

Torrequerade Bloque-7 ATC-73229630, Benalmedena-Costa

Malaga-Spain Tel: (+34) 634 740 214

Email: info@quimicaltierra.es